

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサート
				薬量	希釈水量			
果樹類 (かんきつ、 パナップルを除く)		一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期： 草丈30cm以下)	250～500 mL/10a (0.25～0.5 mL/m <sup>2</sup> )	通常散布 50～100 L/10a (50～100 mL/m <sup>2</sup> ) 少量散布 25～50 L/10a (25～50 mL/m <sup>2</sup> )	3回以内		3回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a (0.5～1 mL/m <sup>2</sup> )				
かんきつ	一年生雑草	250～500 mL/10a (0.25～0.5 mL/m <sup>2</sup> )						
	多年生雑草	500～1000 mL/10a (0.5～1 mL/m <sup>2</sup> )						
だいず	—	一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a (0.25～0.5 mL/m <sup>2</sup> )		2回以内	雑草茎葉散布	4回以内
えだまめ		一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期： 草丈30cm以下)					
			畦間処理： 雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し、収穫前日まで					
は種7日前まで (雑草生育期)	1回							
小麦		多年生イネ科 雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期： 草丈30cm以下)	250～1000 mL/10a (0.25～1 mL/m <sup>2</sup> )	25～100 L/10a (25～100 mL/m <sup>2</sup> )	3回以内		3回以内
		一年生雑草	は種後出芽前 (雑草生育期)	250～500 mL/10a (0.25～0.5 mL/m <sup>2</sup> )				
			多年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期： 草丈30cm以下)	500～1000 mL/10a (0.5～1 mL/m <sup>2</sup> )			
	圃場内の 周縁部		収穫7日前まで (雑草生育期)	250 mL/10a (0.25 mL/m <sup>2</sup> )	25～100 L/10a (25～100 mL/m <sup>2</sup> )	3回以内		
麦類 (小麦を除く)	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a (0.25～0.5 mL/m <sup>2</sup> )	100L/10a (100mL/m <sup>2</sup> )	1回		2回以内
かんしょ		一年生雑草	は種後出芽前 (雑草生育期)		25～100 L/10a (25～100 mL/m <sup>2</sup> )			
			耕起又は挿苗 7日前まで (雑草生育期)		100L/10a (100mL/m <sup>2</sup> )			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサート					
				薬量	希釈水量								
だいこん	—	一年生雑草	耕起又はは種 7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a (0.25～0.5 mL/m <sup>2</sup> )	100L/10a (100mL /m <sup>2</sup> )	1回	雑草茎葉散布	2回以内					
はつかだいこん								1回					
キャベツ								2回以内					
とうがらし類 にんじん ピーマン													
アスパラガス オリーブ(葉) きゅうり しゃくやく(薬用) たまねぎ たらきのき トマト なす びわ(葉) ほうれんそう レタス									3回以内				
薬用にんじん									10回以内 (1年間に2回以内)				
野菜類 (えだまめ、 キャベツ、 はつかだいこん、 だいこん、 とうがらし類、 にんじん、 ピーマン、 ねぎ、たまねぎ、 アスパラガス、 オリーブ(葉)、 きゅうり、 しゃくやく(薬用)、 たらきのき、 トマト、なす、 びわ(葉)、 ほうれんそう、 レタス、 薬用にんじん を除く)								耕起又は定植 7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a (0.25～0.5 mL/m <sup>2</sup> )	通常散布 50～100 L/10a (50～100 mL/m <sup>2</sup> ) 少量散布 25～50 L/10a (25～50 mL/m <sup>2</sup> )	1回	雑草茎葉散布	1回
ねぎ								定植後畦間処理 但し、収穫30日前 まで(雑草生育期)			3回以内	3回以内	
水田作物 (水稲を除く) 移植水稲 直播水稲									耕起20～10日前 (雑草生育期)		100L/10a (100mL /m <sup>2</sup> )	1回	2回以内
水田作物 (水田刈跡)								水田刈跡	多年生雑草	雑草生育期	500～1000 mL/10a (0.5～1 mL/m <sup>2</sup> )	25～100 L/10a (25～100 mL/m <sup>2</sup> )	1回
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期： 草丈30cm以下)	250～500 mL/10a (0.25～0.5 mL/m <sup>2</sup> )	通常散布 100L/10a (100 mL/m <sup>2</sup> ) 少量散布 25L/10a (25 mL/m <sup>2</sup> )	2回以内	3回以内						
		多年生雑草		500～1000 mL/10a (0.5～1 mL/m <sup>2</sup> )									

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサート
				薬量	希釈水量			
水田作物 畑作物 (休耕地)	休耕地		雑草生育期 (草丈50cm以下)		通常散布 50～100 L/10a (50～100 mL/m <sup>2</sup> ) 少量散布 25～50 L/10a (25～50 mL/m <sup>2</sup> )	2回以内		3回以内
茶	—	一年生雑草	摘採7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a (0.25～0.5 mL/m <sup>2</sup> )	少量散布 25～50 L/10a (25～50 mL/m <sup>2</sup> )	1回	雑草茎葉散布	2回以内
樹木類	—		雑草生育期		通常散布 50～100 L/10a (50～100 mL/m <sup>2</sup> ) 少量散布 25～50 L/10a (25～50 mL/m <sup>2</sup> )	4回以内		4回以内
樹木等	公園、庭園、 堤とう、 駐車場、 運動場、 宅地、 のり面、 鉄道等	多年生雑草		500 mL/10a (0.5 mL/m <sup>2</sup> )	通常散布 100L/10a (100 mL/m <sup>2</sup> ) 少量散布 25L/10a (25 mL/m <sup>2</sup> )	3回以内	植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 雑草茎葉散布	3回以内
		スギナ	生育盛期	2000 mL/10a (2mL/m <sup>2</sup> )	少量散布 25～50 L/10a (25～50 mL/m <sup>2</sup> )			
林木	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、 ササ類、 クズ等の 多年生雑草 落葉雑草かん木	生育盛期以降	1000 mL/10a (1mL/m <sup>2</sup> )	20～30 L/10a (20～30 mL/m <sup>2</sup> )			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサート
		落葉雑草かん木	5～10月	1mL/カ所 樹径カ所数 10cm以下 2～3 10～20cm 4～8 20cm以上 10	立木注入処理			
畑作物	林地 放置竹林 畑地	竹類	夏～秋期	原液	5～15mL/本		竹稈注入処理	—
樹木等	公園、庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地、 のり面、 鉄道等	落葉雑草かん木	5～10月	原液又は 2倍液	1mL/カ所 樹径カ所数 10cm以下 2～3 10～20cm 4～8 20cm以上 10		立木注入処理	
		雑草かん木	伐採直後		切り口全体に 十分量を塗布		植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 切株塗布処理	

■については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです