

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックス					
稲	—	イネツトムシ	4kg/10a (4g/m ²)	収穫7日前まで	3回以内	—	3回以内					
		カメムシ類 イネミズゾウムシ成虫 ツマグロヨコバイ ウンカ類、コブノメイガ アザミウマ類、イナゴ類 イネドロオイムシ ニカメイチュウ	3～4kg/10a (3～4g/m ²)									
		イネヒメハモグリバエ フタオビコヤガ	3kg/10a (3g/m ²)									
小麦	—	ヒメトビウンカ アブラムシ類	4kg/10a (4g/m ²)	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内					
豆类(種実)		ハスモンヨトウ マメシクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ アブラムシ類、アズキノメイガ										
		えだまめ						ハスモンヨトウ	3～4kg/10a (3～4g/m ²)			
やまのいも	—	シロイチモジヨトウ	4kg/10a (4g/m ²)	—	—	—	—					
さといも		ハスモンヨトウ										
ばれいしょ		テントウムシダマシ類						収穫7日前まで	3回以内	3回以内		
かんしょ		ハスモンヨトウ ナカジロシタバ										
とうもろこし		アワノメイガ									4回以内	4回以内
トマト		コナジラミ類						—	—	2回以内	2回以内	
オクラ		アブラムシ類										3回以内
きゅうり		ウリハムシ						3～4kg/10a (3～4g/m ²)	収穫前日まで	—	—	—
なす		テントウムシダマシ類						4kg/10a (4g/m ²)				
すいか		ハスモンヨトウ ウリハムシ						3～4kg/10a (3～4g/m ²)	収穫3日前まで	3回以内	3回以内	3回以内
キャベツ	ハスモンヨトウ アブラムシ類 アオムシ											
はくさい	アオムシ											
だいこん	—	コナガ	4kg/10a (4g/m ²)	収穫7日前まで	—	—	—					
		アオムシ	3～4kg/10a (3～4g/m ²)									
		ダイコンサルハムシ	4kg/10a (4g/m ²)	収穫21日前まで	—	—	—					
作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックス					
れんこん	—	マメコガネ	4kg/10a (4g/m ²)	収穫14日前まで	—	—	—					
水田作物、畑作物(休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメムシ類	3～4kg/10a (3～4g/m ²)	—	3回以内	散布	3回以内					

■については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。