

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフラン
きゅうり	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌 混和は合計1回以内、 定植後の株元散布は 1回以内、散布は2回 以内)
	アブラムシ類 コナジラミ類	1～2g/株	生育期 但し、収穫開始 14日前まで		株元散布	
		1g/株				
メロン	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2g/株	定植時		植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混 和は合計1回以内、 散布は2回以内)
	アブラムシ類	1g/株				
	コナジラミ類	1～2g/株				
すいか	ワタアブラムシ	2g/株	生育期 但し、収穫 21日前まで	株元散布	4回以内(育苗期の 株元散布及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、定植後の株元 散布は1回以内、散布 は2回以内)	
かぼちゃ	アブラムシ類 コナジラミ類		定植時	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和 及び育苗トレイへの 灌注は合計1回以内、 散布は2回以内)	
			1～2g/株			
なす	ハモグリバエ類 アザミウマ類 コナジラミ類	1～2g/株	生育期 但し、収穫 前日まで	2回以内	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混 和は合計1回以内、 散布及び定植後の 株元散布は合計2回 以内)
	アブラムシ類					
	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株				
トマト ミニトマト	ハモグリバエ類 コナジラミ類	1～2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (培土混和及び灌注は 合計1回以内、育苗期 の株元散布は1回以内、 定植時の土壌混和は 1回以内、散布及び 定植後の株元散布は 合計2回以内)
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫 前日まで	2回以内	株元散布	
	アブラムシ類 コナジラミ類					

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフラン	
ピーマン	アザミウマ類	1～2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌 混和は合計1回以内、 散布及び定植後の 株元散布は合計2回 以内)	
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫 前日まで	2回以内	株元散布		
とうがらし類	アザミウマ類	1～2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌 混和は合計1回以内、 定植後の株元散布は 1回以内、散布は2回 以内)	
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫開始 14日前まで		株元散布		
キャベツ	アオムシ コナガ	2g/株	定植時		2回以内	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和 及び灌注は合計1回 以内、散布は2回以内)
		2～3g/株					
		3g/株					
はくさい	アブラムシ類	2g/株	定植時		2回以内	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和 及び灌注は合計1回 以内、散布は2回以内)
	アオムシ コナガ	2～3g/株					
	ハイマダラノメイガ	3g/株					
ブロッコリー	アブラムシ類 コナガ	2g/株	定植時	2回以内	株元散布	4回以内(は種時の 土壌混和、育苗トレイ への灌注及び定植時 の株元散布は合計1回 以内、生育期の株元灌 注は1回以内、散布及 び定植後の株元散布は 合計2回以内)	
ねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6g/m ²	生育期 但し、収穫 3日前まで	2回以内	株元散布	4回以内(は種時の 土壌混和、育苗トレイ への灌注及び定植時 の株元散布は合計1回 以内、生育期の株元灌 注は1回以内、散布及 び定植後の株元散布は 合計2回以内)	
にんじん	ハモグリバエ類	9g/m ²	は種時	1回	播溝土壌混和	4回以内(は種時の 土壌混和は1回以内、 生育期の株元灌注は1回 以内、散布は2回以内)	
だいこん	アブラムシ類	6g/m ²	生育期 但し、収穫 30日前まで		全面土壌混和	散布	5回以内(は種時の 播溝土壌混和は1回 以内、は種時の全面 土壌混和は1回以内、 粒剤の散布は1回以内、 水溶剤及び液剤の散布 は合計2回以内)
		4～6g/m ²					
		9g/m ²					
チンゲンサイ	キスジノミハムシ	6g/m ²	定植時		土壌混和	3回以内 (は種時及び定植時の 土壌混和は合計1回 以内、散布は2回以内)	
非結球あぶらな科 葉菜類 (チンゲンサイを 除く)			は種時		播溝土壌混和	3回以内 (は種時の土壌混和 は1回以内、散布は 2回以内)	
かぶ							
なばな類 ほうれんそう							
だいず							フタスジヒメハムシ

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフラン
しゅんぎく	ハモグリバエ類	9g/m ²	は種時	1回	播溝土壌混和	3回以内 (は種時及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、散布は2回以内)
			定植時		植溝土壌混和	
いちご	ワタアブラムシ	0.5～1g/株	定植時		植穴土壌混和	1回
オクラ	アブラムシ類	9g/m ²	生育期 但し、収穫開始 14日前まで		株元散布	3回以内 (株元散布は1回以内、 散布は2回以内)
さやえんどう	ハモグリバエ類					
きく ガーベラ	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株 (但し、1m ² 当り 30gまで)	定植時		5回以内	植穴土壌混和
	マメハモグリバエ	2g/株 (但し、1m ² 当り 30gまで)				
	アブラムシ類	20g/m ²	生育期	株元散布		
花き類・ 観葉植物 (きく、 ガーベラ を除く)	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株 (但し、1m ² 当り 30gまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (土壌混和は1回以内)
	アブラムシ類	20g/m ²	生育期	5回以内	株元散布	
つつじ類	ツツジゲンバイ	6g/m ²	発生初期			5回以内

■については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです