





ホウレンソウ；3回散布



ホウレンソウ (福兵衛) : 2回散布



根張り・株張りが向上し、収量が増加する傾向

コマツナ (菜々美) : 1回散布

(品種: 菜々美; 2回目散布後 4日目撮影)



無処理



500倍 散布

葉色濃く、やや旺盛になる傾向


コマツナ (菜々美) ; 3回散布



無処理

藻合力
(500倍 敷布)

株張り良く根が太くなる傾向




コマツナ (夏蒼天) : 2回散布

(品種: 夏蒼天)



株張り、根張りともに向上する傾向



ミズナ (都むすめ) : 1回散布

(品種：京みぞれ；散布後 4日目撮影)



無処理

葉色濃く、やや旺盛になる傾向



500倍 散布

ミズナ (都むすめ) ; 3回散布




(品種：都むすめ)



無処理

藻合力
(500倍 敷布)

株張り向上、根の太りや長さ向上



リーフレタス（フレアルージュ）：3回散布




散布によって収量増加し、アントシアニンも濃くなる傾向


玉レタス（サウザー）；3回散布



玉肥大良好



ハクサイ (きらぼし65) ; 3回散布



ダイコン (夏あおい) : 3回散布


(品種: 夏あおい)



無処理

500倍 敷布

(N = 9)



散布によって収量が増加する傾向

ダイコン (冬神楽) : 3回散布


(品種: 冬神楽)



無処理

500倍 敷布

散布によって長さ・太さともに増加する傾向



果菜類に対しても高い効果を示す

(品種：PC筑陽)



無処理



藻合力 (500倍 敷布)

わき芽の吹きや葉の大きさや枚数が無処理よりも優れ、旺盛になる傾向

灌注でも生育が良くなる傾向

(品種：PC筑陽)



無処理



藻合力（500倍 灌注）

わき芽の吹きや葉の大きさや枚数が無処理よりも優れ、旺盛になる傾向

キャベツ苗：1回灌注

(品種：おきなSP；散布後 5日目撮影)



灌注によって葉の厚みや大きさが向上