

海藻

有機酸

腐植酸


総合力で支える作物の強さ

ソウゴウリョク

薬合力

腐植酸で根の活性を高め、
海藻で生育を促進し、
有機酸で代謝を上げる
総合力で不良環境に負けない強さを！

タキイ種苗株式会社謹製



規格 / 1L, 10L
希釈倍率 / 500~1000倍
使用方法 / 葉面散布、灌注
対象作物 / 作物全般

N	P	K	pH
2.3	0	1	4.5

ソウ ゴウ リョク 藻合力

海藻抽出物 (紅藻類由来)

ストレス下での
生育促進

クエン酸・酢酸

代謝向上
ミネラル吸収の向上

腐植酸

発根促進
養分吸収力向上

海藻抽出物(紅藻類由来)

アミノ酸やミネラルを豊富に含み、ストレス下での生育促進をサポート。

クエン酸、酢酸

土壤中に吸着された養分を可給化することでミネラル吸収を向上して代謝向上をサポート。

腐植酸

発根促進やキレート作用により、根張りや養分吸収力向上をサポート。

◆総合的に作物の生長を支え、環境に強くする!

環境変化を受けやすい露地作物にも効果的。

生育初期からの施用がおすすめ!

ホウレンソウ

曇天時でも旺盛に生育、散布後すぐに株張りの差を確認。



無処理



500倍 散布

ダイコン

圃場にて3回散布。長さ・太さの向上を確認。



無処理

500倍 散布

キャベツ

8月定植、10月収穫。
育苗期、圃場にて計5回
散布。

活着よく、玉が詰まり
重量が向上。



無処理

500倍 散布

【取り扱い上の注意】

- 使用前によく振ってからお使いください。
- 保存時は密栓し、直射日光を避け、凍結する場所や過度な高温になる場所を避けて保管してください。
- 他剤と混用の場合は混和性、薬害などを確認の上、ご使用ください。
- 小児の手が届かない所に置いてください。
- 施肥作業後は洗顔やうがいをし、皮膚への付着物を洗い流してください。
- 空容器は圃場に放置せず、適切に処理してください。
- 肥料以外の用途には使用しないでください。



タキイ種苗株式会社

〒600-8686 京都市下京区梅小路通猪熊東入 TEL(075)365-0123(大代表)
<https://www.takii.co.jp/>